

Alternatief voor MIDAZOLAM® bij palliatieve sedatie	Inductiedosis & Doorbraakdosis	Onderhoudsdosis	Nevenwerkingen	Aandachtspunten
NOZINAN® <ul style="list-style-type: none"> • (Levomepromazine) • Sederend neuroleptic. • Anti-emetisch • amp van 25 mg/cc • Subcutaan SC 	½ à 1 amp SC	<ul style="list-style-type: none"> ° 2 amp SC/24u in SA OF dosis in 2 à 3 bolussen/24u ° verhogen tot max. 8 amp/24u (200 mg) 	<ul style="list-style-type: none"> ° Myoclonieën/EPS R/ lage dosis benzo: 2x 10 mg Valium® Rect 2x 2 à 4 mg Temesta® SC 	<ul style="list-style-type: none"> ° Niet samen met de Final Four: APART SC ° Opstapeling: na 3-tal d dosis halveren ° <i>Verkrijgbaar bij Pallion zolang in voorraad</i>
ETUMINE® <ul style="list-style-type: none"> • (Clotiapine) • Sederend Neuroleptic • amp van 40 mg/4 cc 	½ amp SC	<ul style="list-style-type: none"> ° 2 amp SC/24u in SA OF dosis in 2 à 3 bolussen/24u ° verhogen tot max. 4 amp/24u (160 mg) 	<ul style="list-style-type: none"> ° Myoclonieën /EPS R/ zie Nozinan® ° Neuroleptische koorts R/ Novalgine® 1 gr/2 cc 3x 1g/24u SC bolus 	<ul style="list-style-type: none"> ° Niet samen met de Final Four: APART SC ° Opstapeling: idem ° Bolus: 2 à 4 cc!! Gebruik t.h.v. abdomen
TEMESTA® <ul style="list-style-type: none"> • (Lorazepam) • Benzodiazepine • amp van 4 mg/1 cc 	1 amp SC	3 amp/24u SC		<ul style="list-style-type: none"> ° minder geschikt voor diepe sedatie ° koel bewaren
VALIUM® <ul style="list-style-type: none"> • (Diazepam) • Benzodiapine • amp van 10 mg/2 cc • suppo magistraal (10 mg) 	1 amp rectaal/IM	3 amp/24u rectaal/IM 3x /24u rect. - suppo		<ul style="list-style-type: none"> ° Lipofiel: niet compatibel in kleine volumes ° SC: irritatie insteekplaats

Alternatief igv uitputting MIDAZOLAM®

Symptoomcontrole bij angst/onrust, Epilepsie, Myoclonieën en/of palliatieve sedatie in de terminale fase (onbehandelbaar sympto(o)m(en)) wanneer Midazolam® niet beschikbaar is.

NIET: Morfine®

Morfine® geeft voorbijgaande sufheid/slaperigheid (vooral bij opioïd-naïve patiënten) i.p.v. blijvende bewustzijnsdaling.

Blijven ophogen van Morfine® is een valkuil! Dit geeft eerder aanleiding tot neurotoxiciteit (delier, myoclonieën,...).

Morfine® is naast de behandeling van pijn WEL GESCHIKT voor DYSPNOE (ook acuut) door zijn kalmerend, ademvertragend en -verdiepend effect.

LIEVER NIET: Diazepam®

Diazepam® (Valium®) SC heeft een veel langere half-waarde tijd, waardoor juiste dosage moeilijker te bepalen valt.

Diazepam® is lipofiel waardoor het niet met andere, veelal wateroplosbare, medicaties kan gecombineerd worden in één spuit.

Diazepam® SC geeft irritatie in de insteekplaats waardoor continue toediening bemoeilijkt wordt.



PALLIATIEVE LIMBURGSE ONDERSTEUNINGSEQUIPE
SAMEN VEERKRACHTIG OP DE GRENS VAN LEVEN EN DOOD

WEL: Nozinan® en Etumine® Temesta®

Nozinan® en Etumine® zijn sederende neuroleptica die als alternatief voor diepe sedatie kunnen gebruikt worden. (Nozinan® is bovendien anti-emetisch en neemt minder volume in). Hun werkingsduur is 6 à 8 uur i.p.v. 4 uur en dienen dus continu of 3x per dag gegeven te worden.

Ze kunnen SC best niet gecombineerd worden met andere Final Four medicatie. Het wordt dus aangeraden deze in een aparte (evt. tweede) spuitaanrijver continu SC toe te dienen.

Als bijwerking kunnen EPS en myoclonieën optreden waarvoor dan wel Valium® rectaal (vb Suppo 2x 10 mg/d), kan gegeven worden om dit op te vangen.

Temesta® kan voor anxiolyse en voor lichtere sedatie gebruikt worden.

Midazolam® en Nozinan® zijn beschikbaar bij PALLION zolang de voorraad strekt.