



BEKNOPTE RICHTLIJN TERMINALE ZORG

Equipe-artsen Pallion: Dr. Bossers en Dr. Stulens (011/81 94 74)

Alternatief bij gebrek aan spuitaanrijvers

Mogelijkheid A • Zoals bij een spuitaanrijver:

SC insteken van blijvend subcutaan vlindernaaldje (21G)

1. Hieraan hangt korte verlengleiding (0,4cc) waarop schroefdopje.
Bij verwijdering schroefdopje, kan spuit met medicatie aangekoppeld worden

OF

2. Direct aansluiten van een slotje (clave) = stopje met rubberkje.
Rubbertje kan doorprikt worden met naald voor bolussen.
Bij verwijdering stopje met rubberkje, kan spuit met medicatie aangekoppeld worden

- Geheel, behalve schroefdopje/slotje, vastplakken met doorzichtige Tegaderm®
- Kan maximum 5 à 7 dagen ter plaatse blijven zitten
- Liefst abdominaal aanbrengen indien grotere volumes van meerdere ml
- Kan wel verstoppem dus geen lipofiele producten zoals bv. Valium®
- Spuit gevuld met medicatie (veelal voor 4 uur) aankoppelen en traag leegduwen

Voordeel: de huid dient niet herhaaldelijk doorprikt te worden.

Mogelijkheid B • Medicatiespuit met subcutane naald:

- Spuit gevuld met medicatie (veelal voor 4 uur) via SC naald traag leegduwen.
Indien grotere volumes, gebruik dan liefst de abdominale regio.

Mogelijkheid C:

Pallion leent spuitaanrijvers uit in nood, waarbij de niet-geïnstitutionaliseerde thuiszorg prioriteit geniet. Zo kan de periode, tot het vinden van een spuitaanrijver bij de reguliere organisaties (mutualiteiten/thuisverpleegorganisaties), overbrugd worden.

Wat met de medicatie?

De meeste medicaties voor terminale setting (The Final Four) hebben een werkingsduur van 4 uur (Morfine[®], Buscopan[®]/Scopolamine[®], Litan[®], Midazolam[®]) en mogen gecombineerd gegeven worden.

Deze medicatie kan dus om de 4 uur SC toegediend worden.

vb. 5 mg Morfine[®] + 1 amp 0,5 mg Scopolamine[®] + 5 mg Midazolam[®]

In één spuittoediening om de 4u (dus 6 x/24 u)

= 30 mg Morfine[®] + 6 amp 0,5 mg Scopolamine[®] + 30 mg Midazolam[®]/24 u

Toedieningsuren:

vb. 10.00 - 14.00 - 18.00 - 22.00 - 02.00 - 06.00 uur

Indien nachtelijk uur niet wenselijk is, kan de laatste avonddosis met 50% verhoogd worden.

De medicatie die per uitzondering **om de 8 à 12 u** gegeven dient te worden: **Haldol[®] en Nozinan[®]/Etumine[®]**

Deze kunnen gelijktijdig toegediend worden in aparte injecties aan de:

1ste • 3de • 5de dosis (3 x/24 u)

OF

1ste • 4de dosis (2 x /24 u)